

SPECIALITA' A.T.I. per ANIMALI da REDDITO

PERIODO DI CONSERVAZIONE



PRODOTTO	PERIODO DI VALIDITÀ DOPO PRIMA APERTURA	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
ADECON	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
ARISTOS [®] 4	28 giorni	Proteggere dalla luce
ARISTOS [®] 10	28 giorni	Proteggere dalla luce
ATICAİN [®]	28 giorni	Conservare in frigorifero (2°-8°C) Proteggere dalla luce
BACOLAM [®] sospensione iniettabile	28 giorni	Conservare in luogo fresco e asciutto non > 25°C
CALCIUMVIT B12	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni
CEFATRON [®] ASCIUTTA	-	Conservare a T° non > 25°C
CEFATRON [®] LATTAZIONE	-	Conservare a T° non > 25°C
CLOXALENE [®] ASCIUTTA	-	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
COENZILE 10.000	-	Conservare a T° < 25°C. Proteggere dalla luce Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato
CORMICINA [®]	28 giorni	Conservare a T° non > 25°C
CRONIPART [®]	28 giorni	Conservare a T° non > 25°C, al riparo dalla luce e dal calore
DENFUS [®] SPRAY	-	Conservare a T° non > 25°C, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Recipiente sotto pressione: non forare o danneggiare la bombola, tenere lontano da bombola anche se svuotata Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni
DOXIBON [®]	30 giorni	Conservare al riparo da luce e umidità Dopo dissoluzione in acqua: usare entro 24 ore L'acqua medicata va conservata al riparo dalla luce Dopo dissoluzione nel mangime liquido: usare immediatamente dopo prima apertura
EFFEKTOR [®]	3 mesi	Dopo diluizione conformemente alle istruzioni somministrare entro 12 ore. Dopo preparazione dell'alimento liquido medicato, usare immediatamente e non conservare.
ENTEROCIDE [®]	2 mesi. Dopo la prima apertura tenere il sacco ben chiuso per proteggerlo dall'umidità	Dopo dissoluzione in acqua o nel latte: usare entro 24 ore
EMDOCAM [®]	28 giorni	Non richiede alcuna condizione speciale di conservazione
ESTROTEK [®]	28 giorni	Conservare a T° non > 25°C, al riparo da luce e da calore
FENLEVE [®] 10	28 giorni	Non richiede alcuna condizione speciale di conservazione
FERTALTA [®]	28 giorni	Conservare a T° non > 25°C Proteggere dalla luce
FLORGANE [®]	28 giorni	Proteggere dalla luce, non refrigerare o congelare
FLUIMASTIN	-	Non conservare a T° > 30°C
HALAGON	6 mesi	Proteggere dalla luce
KEYTIL [®]	28 giorni	Proteggere dalla luce
MASTERCEF [®]	28 giorni	Conservare a T° non > 25°C Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni
MASTERFLOX [®] 10 SOLO	28 giorni	Proteggere dalla luce
MASTIVIA [®]	-	Conservare a T° non > 25°C
METAMERAZINA	28 giorni	Conservare in luogo fresco e asciutto
MYOMETRYL	28 giorni	Proteggere in luogo asciutto al riparo dalla luce Dopo la prima apertura conservare in frigorifero (2-8°C)
OCNIL [®]	6 mesi	Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: 24 ore
OSSINOVA	60 giorni. Dopo la prima apertura tenere il sacco ben chiuso per proteggerlo dalla luce e dall'umidità	Conservare in luogo fresco e asciutto Dopo dissoluzione nel mangime liquido: usare immediatamente dopo prima apertura Dopo dissoluzione in acqua: usare entro 24 ore
OXTRA [®] PESSARI EFFERVESCENTI	-	Conservare in luogo asciutto al riparo dal calore e dalla luce
PRONTOCILL [®]	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e da fonti di calore
RAPISON	28 giorni	Proteggere dalla luce
SPASMOLAX	14 giorni	Non richiede alcuna condizione speciale di conservazione
SULFAPRIM [®]	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 5 anni
SUPERTON	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Nelle somministrazioni perfusionali, in cui nel flacone è inserito il deflussore, il medicinale deve essere utilizzato subito dopo la prima apertura e l'eventuale residuo deve essere eliminato e non conservato
TILMIPRIL	28 giorni	Non conservare a T° > 30°C Conservare il flaconcino nella confezione esterna di cartone per proteggerlo dalla luce Non congelare Non conservare a T° > 25°C dopo aver prelevato la prima dose
TOLOMEC [®]	12 mesi	Conservare i flaconi nelle scatole per proteggerli dalla luce Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 5 anni
TOLOMEC [®] PLUS	28 giorni	Conservare il flacone nella confezione originale per proteggerlo dalla luce
URFAMUCOL [®] iniettabile	-	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Dopo la ricostituzione il prodotto deve essere immediatamente consumato e correttamente conservato
VETIL	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
VITALENE [®] E	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
VITATOX	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: 2 anni
ZOOLOBELIN	-	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore Dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato

SPECIALITA' A.T.I. per ANIMALI da COMPAGNIA
PERIODO DI CONSERVAZIONE



PRODOTTO	PERIODO DI VALIDITÀ DOPO PRIMA APERTURA	MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
AFILARIA ® compresse	-	Non conservare a T° > 25°C Conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e lontano dalle fonti di calore Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione
AFILARIA ® SR sospensione iniettabile	3 mesi	Non conservare a T° > 25°C Non congelare Conservare i flaconi nella confezione originale per proteggerli dalla luce Dopo ricostituzione il prodotto deve essere conservato in frigorifero a T° 2°C-8°C
AMYCO Shampoo	3 mesi	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
ANTIMANIA ® compresse	Dopo l'apertura del contenitore usare immediatamente e non conservare	Non conservare a T° > 25°C
ARISTOS ® P compresse	3 giorni	Non richiede alcuna specifica condizione di conservazione
ATIDORM iniettabile	28 giorni	Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione
ATROPINA SOLFATO iniettabile	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce
CARDINEFRIL	1 giorno	Non conservare a T° > 25°C Conservare ogni parte della compressa divisa non utilizzata nel blister, all'interno dell'imballaggio esterno al riparo dalla luce e dall'umidità Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione
CONTINENCE ® sciroppo	3 mesi	Non conservare a T° > 25°C
CRIPOLAT ® soluzione orale	12 giorni	Non conservare a T° > 25°C
DECONGESTA ® compresse	3 giorni	Nessuna specifica condizione di conservazione
DERMAXID Shampoo	6 mesi	Non conservare a T° > 25°C
DEXTROQUILLAN ® iniettabile	3 mesi	Non congelare Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione
DORMISAN iniettabile	28 giorni	Non refrigerare o congelare Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
DUELMINT 20-40 pasta os	28 giorni	Non conservare a T° > 25°C. Proteggere dalla luce
FILAVAC VHD K C+V 5 fl da 0,5 ml	14 mesi	Conservare e trasportare in frigorifero a T° 2°C-8°C Conservare al riparo dalla luce Non congelare
HEPAGEN ® per cani	3 mesi	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
KILLITAM gocce os - compresse	6 mesi (gocce)	Nessuna specifica condizione di conservazione
KONCLAV ® compresse	-	Non conservare a T° > 25°C.
LIDOCAINA 2% iniettabile	28 giorni	Non conservare a T° > 25°C. Proteggere dalla luce
OTOPET ® gocce otologiche	3 mesi	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
OTOPET ® Terapia sospensione otologica	6 mesi	Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
PREQUILLAN ® iniettabile	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
PRIVAPROL ® iniettabile	28 giorni	Conservare al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore
PROPANCAT ® compresse	-	Le compresse divise e non utilizzate devono essere eliminate.
PROPANTELM ® compresse	-	Nessuna specifica condizione di conservazione
UNACEF ® compresse	3 giorni	Conservare il blister nell'imballaggio esterno per proteggerlo dalla luce e dall'umidità
VALEMAS ® 5 iniettabile	28 giorni	Nessuna specifica condizione di conservazione
VITOFYLLIN ® compresse	3 giorni	Conservare i blister nella confezione originale, in un luogo asciutto