

PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
ADECON	28 gg	0 ore	•••
ARISTOS® 4	6 gg suini	-	•••
ARISTOS® 10	Bovini: Infez. resp.: (2 mg/kg - e.v./i.m./s.c.) 6 gg (8 mg/kg - i.m.) 3 gg Mastiti: (2 mg/kg - e.v./i.m./s.c.) 6 gg Scrofe: 4 gg	Bovini: Infez. resp.: (2 mg/kg - e.v./i.m./s.c.) 36 ore (8 mg/kg - i.m.) 72 ore Mastiti: (2 mg/kg - e.v./i.m./s.c.) 36 ore	•••
ATAICAIN®	0 gg	0 gg	••
BACOLAM® sospensione iniettabile (1-2-3)	28 gg bovini, ovi-caprini, equini - 13 gg suini - 25 gg tacchini	-	•••
CALCIUMVIT B12	0 gg	0 ore	••
CEFATRON® ASCIUTTA	8 gg	0 ore	•••
CEFATRON® LATTAZIONE	10 gg	96 ore (8 mungiture)	•••
CLOXALENE® ASCIUTTA	42 gg	72 ore (6 mungiture)	•••
COENZILE 10.000	0 gg	0 ore	••
CORMICINA®	74 gg bovini - 44 gg suini	192 ore (16 mungiture)	•••
CRONIPART®	1 g	-	••
DENFUS® SPRAY	0 gg	0 ore	••
DOXIBON® (3)	4 gg suini - 3 gg polli da carne - 10 gg tacchini	-	•••
EFFEKTOR® (3)	2 gg vitelli - 1 g suini - 1 g polli da carne - 1 g tacchini	-	•••
EMDOCAM® (1)	15 gg bovini - 5 gg suini, cavalli	5 gg bovini (10 mungiture)	•••
ENTEROCIDE® (2-3)	7 gg vitelli, annutoli, agnelli, capretti, suini - 5 gg conigli - 0 gg polli, tacchini	-	•••
ESTROTEK®	0 gg bovini - 1 g equini, suini	0 ore	••
FENLEVE® 10	Bovini: 0 gg e.v., 4 gg i.m. - Equini: 4 gg - Suini: 4 gg	0 ore	•••
FERTALTA® (8)	0 gg	0 ore	••
FLORGANE® (4)	37 gg bovini - 22 gg suini	-	•••
FLUIMASTIN	16 gg	168 ore (14 mungiture) bovine in lattazione 144 ore (12 mungiture) bovine in asciutta	•••
HALAGON	13 gg	-	•••
KEYTIL® (2)	93 gg	-	•••
MASTERCEF®	5 gg bovini - 3 gg suini	24 ore (2 mungiture)	•••
MASTERFLOX® 10 SOLO	8 gg suini	-	•••
MASTIVIA®	4 gg	120 ore (10 mungiture)	•••
METAMERAZINA (1-3)	24 gg bovini, ovini, equini, suini 18 gg polli, conigli	72 ore (6 mungiture) e.v. 168 ore (14 mungiture) i.m./e.p.	•••
MYOMETRYL	0 gg	0 ore	••
OCNIL® (3)	1 g suini - 5 gg polli	-	•••
OSSINOVA	20 gg vitelli da latte - 12 gg suini, tacchini - 7 gg polli da carne - 5 gg ovaiole uova	-	•••
OXTRA® PESSARI EFFERVESCENTI	10 gg bovini	84 ore (7 mungiture)	•••
PRONTOCILL® (1)	20 gg	192 ore (16 mungiture)	•••
RAPISON (1)	7 gg bovini - 2 gg suini - 11 gg equini	60 ore bovini (5 mungiture)	•••
SPASMOLAX	0 gg	0 ore	•••
SULFAPRIM® (1)	20 gg bovini - 16 gg suini - 30 gg equini	96 ore bovini (8 mungiture)	•••
SUPERTON	0 gg	0 ore	••
TILMIPRIL (9)	70 gg bovini - 42 gg ovini	36 gg bovini - 18 gg ovini	•••
TOLOMEC® (5-6)	49 gg bovini - 12 gg ovini - 14 gg suini	-	•••
TOLOMEC® PLUS (4)	66 gg	-	•••
URFAMUCOL® iniettabile (3)	20 gg bovini - 15 gg tacchini	168 ore (14 mungiture)	•••
VETIL	35 gg bovini, suini	168 ore (14 mungiture)	•••
VITALENE® E	0 gg	0 ore	••
VITATOX	28 gg	0 ore	•••
ZOOLOBELIN	0 gg	0 ore	••

SPECIALITA' A.T.I. - MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

PRODOTTO	RICETTA	PRODOTTO	RICETTA
AFILARIA®	•	FILAVAC VHD K C+V 5 fl da 0,5 ml	•••
AFILARIA® SR	•	HEPAGEN® per cani	•
AMYCO Shampoo	•	KILLITAM	•
ANTIMANIA®	•	KONCLAV®	•
ARISTOS® P	•	LIDOCAINA 2%	••
ATIDORM	••	OTOPET®	SP
ATROPINA SOLFATO	••	OTOPET® TERAPIA	•
CARDINEFRIL	•	PREQUILLAN®	••
CONTINENCE®	•	PRIVAPROL®	••
CRIPTOLAT®	•	PROPANCAT®	SP
DECONGESTA®	•	PROPANTELM®	•
DERMAXID Shampoo	SP	UNACEF®	•
DEXTROQUILLAN®	•••	VALEMAS® 5	•
DORMISAN	•••	VITOFYLLIN®	•
DUELMINT	SP		

(1) Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

(2) Non somministrare in animali il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

(3) Non somministrare in animali in ovodeposizione le cui uova siano destinate al consumo umano.

(4) Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

(5) Non utilizzare in vacche in asciutta, in riproduzione ed in lattazione il cui latte o derivati siano destinati al consumo umano.

(6) Nelle pecore di razze da latte impiegare il prodotto soltanto nelle femmine in asciutta e, comunque, non nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

(7) Non utilizzare in animali da latte in lattazione e nei 60 giorni antecedenti la data prevista del parto.

(8) Non utilizzare in trote destinate al consumo umano.

(9) Se il prodotto viene somministrato a bovine in asciutta o a bovine da latte gravide, il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 36 giorni dopo il parto.

Se il prodotto viene somministrato a pecore in asciutta o in gravidanza, il latte non deve essere utilizzato per il consumo umano fino a 18 giorni dopo il parto.

- Ricetta ministeriale in triplice copia a ricalco. Specialità medicinale soggetta al DPR 309/90 e successive modifiche, tab II, sez. A
- Ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria ripetibile
- SP Senza prescrizione